

## NOTAT Blisterpakninger

I perioden 30. september til 11. oktober 2022 har DSR Analyse gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne af Dansk Sygeplejeråds medlemspanel. 46% af de 3.323 inviterede medlemmer deltog i undersøgelsen.

### Hovedresultater

- Omkring halvdelen af sygeplejerskerne i regionerne (50%) og kommunerne (49%) trykker som en del af deres arbejde tabletter ud af blisterpakninger ca. en gang om ugen eller oftere.
- Kommunale sygeplejersker, der trykker tabletter ud af blisterpakninger, trykker typisk flere ud, når de doserer tabletter, sammenlignet med dem, der er ansat i regionerne.
- En tredjedel (32%) af sygeplejerskerne, der trykker tabletter ud af blisterpakninger, oplever fysiske gener/smerter ved arbejdet med blisterpakninger. Blandt de kommunale sygeplejersker gælder det 59%.
- Der er en tendens til at de sygeplejersker, der oftere trykker tabletter ud, i højere grad rapporterer fysiske gener ved arbejdet med blisterpakninger. Det samme gælder dem, der typisk trykker flere tabletter ud ved dosering.

### Blisterpakninger

Tablet 1 viser hvor ofte det indgår i sygeplejerskernes arbejdsdag at trykke tabletter ud af blisterpakninger. 24% af alle de adspurgte sygeplejersker svarer, at de hver arbejdsdag trykker tabletter ud af blisterpakninger. Blandt regionale sygeplejersker er det 29%, mens det gælder 18% af de kommunale.

15% af de regionale sygeplejersker svarer, at det flere gange om ugen indgår som en del af deres arbejdsdag at trykke tabletter ud af blisterpakninger, mens det gælder 25% af de kommunale. På tværs af alle sektorer gælder det 17%.

6% svarer, at de ca. en gang om ugen trykker tabletter ud af blisterpakninger som en del af deres arbejdsdag, det gælder både for regionale og kommunale sygeplejersker, samt den fulde gruppe beskæftigede sygeplejersker.

Dermed trykker ca. halvdelen af sygeplejerskerne i regionerne (50%) og kommunerne (49%) tabletter ud af blisterpakninger som en del af deres arbejde ca. en gang om ugen eller oftere.

11% af de regionalt ansatte sygeplejersker trykker tabletter ud af blisterpakninger sjældnere end en gang om ugen, mens det gælder 13% af de kommunalt ansatte og 11% af alle de beskæftigede.

I alt trykker 57% af de beskæftigede sygeplejersker, 62% af de kommunale sygeplejersker og 60% af de regionale sygeplejersker tabletter ud af blisterpakninger i forbindelse med deres arbejde.

**Tablet 1.** Hvor ofte indgår det i din arbejdsdag at trykke tabletter ud af blisterpakninger?

	Region	Kommune	Alle beskæftigede
Hver arbejdsdag	29%	18%	24%
Flere gange om ugen	15%	25%	17%
Ca. en gang om ugen	6%	6%	6%
Sjældnere end en gang om ugen	11%	13%	11%
Jeg trykker ikke tabletter ud af blisterpakninger som en del af mit arbejde.	39%	37%	42%
Ved ikke	1%	1%	1%
Antal	933	348	1417

Anm. Alle sygeplejersker i beskæftigelse. Forskellen på sektorer er signifikant. Procenter summerer ikke nødvendigvis til 100 grundet afrunding. Kilde: DSR analyse/MEGAFON

Af tabel 2 fremgår mængden af tabletter sygeplejerskerne typisk trykker ud, når de doserer dem. 18% af de regionale sygeplejersker, der som en del af deres arbejde trykker tabletter ud, trykker typisk 4 eller derunder ud, mens det gælder 4% af de kommunale. 24% af sygeplejerskerne i regionerne trykker mellem 5 og 19 ud mod 4% i kommunerne.

12% af de regionale sygeplejersker trykker typisk 20-99 tabletter ud sammenlignet med 30% i kommunerne.

1% af de regionale sygeplejersker svarer, at de typisk trykker 100 tabletter eller derover ud, når de doserer tabletter, mens det næsten gælder en fjerdedel (24%) af de kommunale sygeplejersker.

Således fremgår det, at de kommunale sygeplejersker typisk trykker flere tabletter ud, når de doserer sammenlignet med de regionale.

**Tablet 2.** Hvor mange tabletter trykker du typisk ud, når du doserer tabletter?

	Region	Kommune	I alt
4 eller derunder	18%	4%	15%
Fra 5 til 19	24%	4%	19%
Fra 20 til 99	12%	30%	16%
100 eller derover	1%	24%	8%
Kan ikke vurdere	45%	38%	43%
Antal	565	217	817

Anm. Alle sygeplejersker i beskæftigelse, der har svaret, at de trykker tabletter ud af blisterpakninger. Forskellen på sektorer er signifikant. Procenter summerer ikke nødvendigvis til 100 grundet afrunding. Kilde: DSR analyse/MEGAFON

Tablet 3 viser andelen af sygeplejersker, der oplever fysiske gener/smerte i forbindelse med arbejdet med blisterpakkede tabletter fordelt på sektorer. Det er især de kommunale sygeplejersker, der rapporterer at opleve gener i forbindelse med arbejdet med blisterpakkede tabletter, således svarer 59% at de oplever fysiske gener.

Til sammenligning gælder det 22% af de regionale sygeplejersker og 32% af alle adspurgte sygeplejersker.


**Tabel 3.** Oplever du fysiske gener/smerter i forbindelse med arbejdet med blisterpakkede tabletter?

	Region	Kommune	I alt
Ja	22%	59%	32%
Nej	72%	36%	62%
Ved ikke	6%	6%	6%
Antal	565	217	817

Anm. Alle sygeplejersker i beskæftigelse, der har svaret, at de trykker tabletter ud af blisterpakkninger. Forskellen på sektorer er signifikant. Procenter summerer ikke nødvendigvis til 100 grundet afrunding. Kilde: DSR analyse/MEGAFON

Figur 1 viser, at der generelt er en tendens til, at dem der oftere trykker tabletter ud af blisterpakkninger, i højere grad rapporterer, at de oplever smerter eller andre fysiske gener i forbindelse arbejdet med blisterpakkninger. Således svarer 37% af dem, der hver arbejdsdag trykker tabletter ud, at de oplever fysiske gener i forbindelse med arbejdet med blisterpakkninger, mens det gælder 14% af dem, der sjældnere end ugentligt trykker tabletter ud.

**Figur 1.** Oplevelse af fysiske gener/smerter i forbindelse med arbejdet med blisterpakkninger fordelt på hyppighed




Anm. 817 sygeplejersker, der i forbindelse med deres arbejde trykker tabletter ud af blisterpakkninger. Forskellen er signifikant. Procenter summerer ikke nødvendigvis til 100 grundet afrunding. Kilde: DSR analyse/MEGAFON

Figur 2 viser oplevelsen af gener i forbindelse med arbejdet med blisterpakkninger fordelt på mængden af tabletter, sygeplejerskerne typisk trykker ud, når de doserer tabletter. Blandt de sygeplejersker, der typisk trykker 20 eller flere tabletter ud svarer over halvdelen (54%), at de oplever fysiske gener, mens det gælder 8% af dem, der trykker 4 eller derunder ud.

**Figur 2.** Oplevelse af fysiske gener/smerter i forbindelse med arbejdet med blisterpakkede fordelt på antal

Hvor mange tabletter trykker du typisk ud, når du doserer tabletter?



Anm. 467 sygeplejersker, der har angivet et ca. antal tabletter, de trykker ud, når de doserer dem. Forskellen er signifikant. Procenter summerer ikke nødvendigvis til 100 grundet afrunding. Kilde: DSR analyse/MEGAFON